



Weidevogelsgroep Raamsdonk e.o.



Eerste jaargang, Nummer 4

Voor INTERN & EXTERN-gebruik

Nieuwsbrief 16 maart 2024

Veldleeuweriken in de Gecombineerde Willemspolder.

Over enige tijd gaan we het veld weer in om de weidevogels te beschermen. Het gaat in ons werkgebied voornamelijk om kieviten, scholeksters en een enkele wulp. Maar als vogelliefhebber zie en hoor ik vooral ook andere vogels zoals graspiepers, gele kwikstaarten en veldleeuweriken. Die laatste drie horen ook tot de categorie weidevogels. Het zijn dan wel geen steltlopers maar zangvogels die in het agrarisch gebied leven. Het beschermen van deze vogels is een haast onbegonnen zaak want ze verbergen hun nesten zo goed dat het haast uitgesloten is dat je er een vindt.

Met name in het oostelijke deel van de Willemspolder broeden nog een aantal veldleeuweriken. Het zijn hooguit nog een koppeltje of vijf van die prachtige zomerse zangers. In het overige deel van de polder hoor of zie je ze eigenlijk niet. Ik maak mij best wel zorgen om deze vogels want landelijk gaat de populatie veldleeuwerik dramatisch snel achteruit. Inmiddels is de landelijke populatie in de laatste veertig jaar met meer dan 90% achteruit gegaan.

Gelukkig heeft de Gemeente Oosterhout de plannen voor nieuwbouw in de Gecombineerde Willemspolder geschrapt en is voor de leeuweriken het gevaar in het Oostelijke deel van de Willemspolder voorlopig geweken. Een belangrijke beslissing waar ze bij de Gemeente op het gebied van de veldleeuwerik geen weet van hebben. Door deze beslissing is mijn verhaal over de veldleeuwerik ook veranderd en klinkt het net ietsje minder negatief maar we zijn er nog niet.



Een belangrijke reden van de achteruitgang is het gebruik van het agrarisch gebied. Met een goed voorjaar met voldoende regenval en zonneschijn wordt het gras ongeveer om de vijf-zes weken gemaaid. De periode tussen de maaibeurten is net te kort om een nestpoging succesvol te kunnen voltooien. Door de daardoor regelmatig mislukte legsels, brengen veldleeuweriken gemiddeld ongeveer 1.8 jongen per paar groot en dat is net te weinig om het voortbestaan van de soort te waarborgen. Daarvoor heb je gemiddeld 2.0 jongen nodig.

Het zou heel mooi zijn als in onze polder wat meer extensief geboerd zou worden zodat de weidevogels net wat meer tijd krijgen om legsels veilig uit te broeden. Ook is het belangrijk dat de eerste maaibeurt pas na 1 juni plaatsvindt. Daarbij neemt op die manier ook het aantal insecten toe zodat er voor de jonge vogeltjes ook nog wat te eten is.

Vanaf deze maand beginnen de eerste veldleeuweriken al te zingen en als er 1 vogelgeluid is wat aan de zomer doet denken dan is dat (samen met de koekoek), de veldleeuwerik wel. Ik moest aan deze vogel denken omdat ik vanmorgen, 2 februari in alle vroegte twee veldleeuweriken over de Oranjepolder naar het noorden zag vliegen.